

**Семейная средиземноморская лихорадка (периодическая болезнь):
современный взгляд на проблему.**

Научный руководитель – Клиновская Анна Сергеевна

Абрамян Седя Араевна

Студент (специалист)

Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.

Евдокимова, Москва, Россия

E-mail: seda-abramyan@rambler.ru

Периодическая болезнь (ПБ) — наследственное аутосомно-рецессивное заболевание, распространенное среди представителей древних народов средиземноморского побережья. В основе периодической болезни лежит точечная мутация в гене белка пирина, расположенного в коротком плече 16-й хромосомы. Клинические проявления заболевания описаны у армян, турок, арабов, евреев, народов Северного Кавказа. Миграционный процесс, рост числа межэтнических браков и ряд других факторов создают условия для широкого распространения болезни. Поэтому, проблема ССЛ актуальна для российской медицины, поскольку население России формировалось как полиэтническое сообщество. [2]

Цель: изучение особенностей течения заболевания у пациентов с ССЛ в России.

Материалы и методы:

Нами были изучены литературные источники и проведен анализ данных и статистическая обработка.

Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, страдающих семейной средиземноморской лихорадкой и определены проявления в ЧЛО.

Было проведено анкетирование среди населения РФ, в котором число респондентов составило 510. Среди опрошенных 265(51,9%) - представители армянской национальности, 201 (39,4%) - представители русской национальности.

Результаты:

Проанализировав данные, полученные в литературных источниках, и данные анкетирования, можно пронаблюдать схожие показатели. Так, по результатам анкетирования максимальная распространенность носительства гена MEFV среди представителей армянской национальности составила 1:136, а по данным литературы - 1:100 [1]. Изучение историй болезни пациентов, страдающих периодической болезнью, позволяют отметить, что каждому больному требуется индивидуальный подход к наблюдению, назначению лечения и профилактике частых проявлений приступов. В настоящее время специалисты педиатрического профиля мало осведомлены о ПБ. В следствии этого, нами было выявлено большое количество ошибок при постановке диагноза. Актуальность проблемы ранней диагностики и изучения особенности течения заболевания у пациентов с семейной средиземноморской лихорадкой среди населения РФ довольно высока. У 86,5% респондентов появился интерес к более подробному изучению особенностей клиники и течения ПБ, среди которых есть так же студенты медицинских ВУЗов РФ.

Выводы:

В результате проделанной нами работы, а именно - составления литературного обзора, проведения анкетирования и изучения историй болезни, были сделаны следующие выводы:

1. Особенности течения заболевания у пациентов с Периодической болезнью в России недостаточно изучены и требуют более детального рассмотрения.
2. Помимо типичных проявлений ПБ, проявления заболевания в ЧЛО остаются незамеченными специалистами смежных специальностей, что затрудняет диагностику и дальнейшее ведение пациента.

3. Актуальность изучения особенностей течения периодической болезни в РФ очень высока не только среди врачей педиатрического профиля, но и среди других врачей.

Источники и литература

- 1) Г.Амарян, Т.Саркисян, А.Айрапетян. Семейная средиземноморская лихорадка у детей (периодическая болезнь): клинические и генетические аспекты. // Методическое пособие - Ер.: Медицинский комплекс “Арабкир” – Институт здоровья детей и подростков, 2012. - 84 с.
- 2) Федоров Е.С., Салугина С.О., Кузьмина Н.Н. Семейная средиземноморская лихорадка (периодическая болезнь): современный взгляд на проблему // Современная ревматология. 2013. № 1. С. 24-30.